



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 682 869 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 95106925.1

51 Int. Cl.<sup>6</sup>: **A01N 61/00, A01N 51/00**

22 Anmeldetag: 08.05.95

30 Priorität: 20.05.94 DE 4417742

71 Anmelder: **BAYER AG**

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
22.11.95 Patentblatt 95/47

**D-51368 Leverkusen (DE)**

84 Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL PT  
SE**

72 Erfinder: **Dorn, Hubert, Dr.**  
**Pahlkestrasse 71**  
**D-42115 Wuppertal (DE)**  
Erfinder: **Hopkins, Terence, Dr.**  
**41 Boomerang Road**  
**Tamborine, Qld. (AU)**

54 **Nicht-systemische Bekämpfung von Parasiten.**

57 Verwendung von Agonisten und Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten wie Flöhen, Läusen und Fliegen an Menschen und Tieren.

**EP 0 682 869 A1**

Die vorliegende Erfindung betrifft die nicht-systemische Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Menschen und Tieren mittels Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten.

Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten sind bekannt. Zu ihnen gehören die Nicotiny-Insektizide und ganz besonders die Chlornicotiny-Insektizide. Es ist auch bekannt, daß diese Verbindungen hervorragend gegen pflanzenschädigende Insekten wirken. Die systemische Wirkung dieser Verbindungen in Pflanzen gegen pflanzenschädigende Insekten ist ebenfalls bekannt.


Aus der PCT-Anmeldung WO 93/24 002 ist bekannt, daß sich bestimmte 1-[N-(Halo-3-pyridylmethyl)]-N-methylamino-1-alkylamino-2-nitroethylen-Derivate zur systemischen Anwendung gegen Flöhe bei Haustieren eignen. Bei dieser Art der Anwendung wird der Wirkstoff dem Haustier oral oder parenteral z.B. durch Injektion verabreicht und gelangt so in die Blutbahn des Haustieres. Die Flöhe nehmen den Wirkstoff dann beim Blutsaugen auf. Als ungeeignet zur Bekämpfung der Flöhe an Haustieren wird nach WO 93/24 002 die nicht-systemische Art der Anwendung dargestellt.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß sich gerade Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten besonders zur nicht-systemischen Bekämpfung parasitierender Insekten wie Flöhe, Läuse oder Fliegen an Menschen und Tieren eignen.

Agonisten oder Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten sind bekannt z.B. aus Europäische Offenlegungsschriften Nr. 464 830, 428 941, 425 978, 386 565, 383 091, 375 907, 364 844, 315 826, 259 738, 254 859, 235 725, 212 600, 192 060, 163 855, 154 178, 136 636, 303 570, 302 833, 306 696, 189 972, 455 000, 135 956, 471 372, 302 389; Deutsche Offenlegungsschriften Nr. 3 639 877, 3 712 307; Japanische Offenlegungsschriften Nr. 03 220 176, 02 207 083, 63 307 857, 63 287 764, 03 246 283, 04 9371, 03 279 359, 03 255 072; US-Patentschriften Nr. 5 034 524, 4 948 798, 4 918 086, 5 039 686, 5 034 404; PCT-Anmeldungen Nr. WO 91/17 659, 91/4965; Französische Anmeldung Nr. 2 611 114; Brasilianische Anmeldung Nr. 88 03 621.


Auf die in diesen Publikationen beschriebenen Methoden, Verfahren, Formeln und Definitionen sowie auf die darin beschriebenen einzelnen Präparationen und Verbindungen wird hiermit ausdrücklich Bezug genommen.

Diese Verbindungen lassen sich bevorzugt durch die allgemeine Formel (I) wiedergeben



in welcher

- R für Wasserstoff, gegebenenfalls substituierte Reste der Gruppe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl oder Heteroarylalkyl steht;
- A für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Wasserstoff, Acyl, Alkyl, Aryl steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest Z verknüpft ist;
- E für einen elektronenziehenden Rest steht;
- X für die Reste -CH= oder =N- steht, wobei der Rest -CH= anstelle eines H-Atoms mit dem Rest Z verknüpft sein kann;
- Z für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Alkyl, -O-R, -S-R,




steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest A oder dem Rest X verknüpft ist.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), in welcher die Reste folgende Bedeutung haben:

- R steht für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl, Heteroarylalkyl.  
 Als Acylreste seien genannt Formyl, Alkylcarbonyl, Arylcarbonyl, Alkylsulfonyl, Arylsulfonyl, (Alkyl)-(Aryl)-phosphoryl, die ihrerseits substituiert sein können.
- 5 Als Alkyl seien genannt C<sub>1-10</sub>-Alkyl, insbesondere C<sub>1-4</sub>-Alkyl, im einzelnen Methyl, Ethyl, i-Propyl, sec.- oder t-Butyl, die ihrerseits substituiert sein können.  
 Als Aryl seien genannt Phenyl, Naphthyl, insbesondere Phenyl.  
 Als Aralkyl seien genannt Phenylmethyl, Phenethyl.
- 10 Als Heteroaryl seien genannt Heteroaryl mit bis zu 10 Ringatomen und N, O, S insbesondere N als Heteroatomen. Im einzelnen seien genannt Thienyl, Furyl, Thiazolyl, Imidazolyl, Pyridyl, Benzthiazolyl.  
 Als Heteroarylalkyl seien genannt Heteroarylmethyl, Heteroarylethyl mit bis zu 6 Ringatomen und N, O, S, insbesondere N als Heteroatomen.
- 15 Als Substituenten seien beispielhaft und vorzugsweise aufgeführt: Alkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl; Alkoxy mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methoxy, Ethoxy, n- und i-Propyloxy und n-, i- und t-Butyloxy; Alkylthio mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylthio, Ethylthio, n- und i-Propylthio und n-, i- und t-Butylthio; Halogenalkyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen und vorzugsweise 1 bis 5, insbesondere 1 bis 3 Halogenatomen, wobei die Halogenatome gleich oder verschieden sind und als Halogenatome, vorzugsweise Fluor, Chlor oder Brom, insbesondere Fluor stehen, wie Trifluormethyl; Hydroxy; Halogen, vorzugsweise Fluor, Chlor, Brom und Jod, insbesondere Fluor, Chlor und Brom; Cyano; Nitro; Amino; Monoalkyl- und Dialkylamino mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen je Alkylgruppe, wie Methylamino, Methyl-ethyl-amino, n- und i-Propylamino und Methyl-n-butylamino; Carboxyl; Carbalkoxy mit vorzugsweise 2 bis 4, insbesondere 2 oder 3 Kohlenstoffatomen, wie Carbomethoxy und Carboethoxy; Sulfo (-SO<sub>3</sub>H); Alkylsulfonyl mit vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatomen, wie Methylsulfonyl und Ethylsulfonyl; Arylsulfonyl mit vorzugsweise 6 oder 10 Arylkohlenstoffatomen, wie Phenylsulfonyl sowie Heteroaryl-amino und Heteroarylalkyl-amino wie Chlorpyridyl-amino und Chlorpyridylmethylamino.
- 20 A steht besonders bevorzugt für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituierte Reste aus der Reihe Acyl, Alkyl, Aryl, die bevorzugt die bei R angegebenen Bedeutungen haben. A steht ferner für eine bifunktionelle Gruppe. Genannt sei gegebenenfalls substituiertes Alkylen mit 1-4, insbesondere 1-2 C-Atomen, wobei als Substituenten die weiter oben aufgezählten Substituenten genannt seien und wobei die Alkylengruppen durch Heteroatome aus der Reihe N, O, S unterbrochen sein können.
- 25 A und Z können gemeinsam mit den Atomen, an welche sie gebunden sind, einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei Alkyl der N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder.
- 30 Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Hexahydro-1,3,5-triazin, Morpholin genannt, die gegebenenfalls bevorzugt durch Methyl substituiert sein können.
- E steht für einen elektronenziehenden Rest, wobei insbesondere NO<sub>2</sub>, CN, Halogenalkylcarbonyl wie 1,5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-carbonyl, insbesondere COCF<sub>3</sub> genannt seien.
- 35 X steht für -CH= oder -N=
- Z steht für gegebenenfalls substituierte Reste Alkyl, -OR, -SR, -NRR, wobei R und die Substituenten bevorzugt die oben angegebene Bedeutung haben.
- Z kann außer dem obengenannten Ring gemeinsam mit dem Atom, an welches es gebunden ist und dem Rest

55



5


an der Stelle von X einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten. Als Heteroatome stehen vorzugsweise Sauerstoff, Schwefel oder Stickstoff und als Heterogruppen N-Alkyl, wobei die Alkyl oder N-Alkyl-Gruppe vorzugsweise 1 bis 4, insbesondere 1 oder 2 Kohlenstoffatome enthält. Als Alkyl seien Methyl, Ethyl, n- und i-Propyl und n-, i- und t-Butyl genannt. Der heterocyclische Ring enthält 5 bis 7, vorzugsweise 5 oder 6 Ringglieder.

10


Als Beispiele für den heterocyclischen Ring seien Pyrrolidin, Piperidin, Piperazin, Hexamethylenimin, Morpholin und N-Methylpiperazin genannt.

15

Als ganz besonders bevorzugt erfindungsgemäß verwendbare Verbindungen seien Verbindungen der allgemeinen Formeln (II) und (III) genannt:



25



35 in welchen

n

für 1 oder 2 steht,


Subst.

für einen der oben aufgeführten Substituenten, insbesondere für Halogen, ganz besonders für Chlor, steht,



A, Z, X und E

die oben angegebenen Bedeutungen haben,



40 Im einzelnen seien folgende Verbindungen genannt:





5





10





15





20





25



30



35




40

45

50

55



Die Wirkstoffe eignen sich bei günstiger Warmblüttoxizität zur Bekämpfung von parasitierenden Insekten, die am Menschen und in der Tierhaltung und Tierzucht bei Haus- und Nutztieren sowie Zoo-, Labor-, Versuchs- und Hobbytieren vorkommen. Sie sind dabei gegen alle oder einzelne Entwicklungsstadien der Schädlinge sowie gegen resistente und normal sensible Arten der Schädlinge wirksam.

Zu den Schädlingen gehören:

Aus der Ordnung der Anoplura z.B. *Haematopinus* spp., *Linognathus* spp., *Solenopotes* spp., *Pediculus* spp., *Pthirus* spp.:

aus der Ordnung der Mallophaga z.B. *Trimenopon* spp., *Menopon* spp., *Eomenacanthus* spp., *Menacanthus* spp., *Trichodectes* spp., *Felicola* spp., *Damalinea* spp., *Bovicola* spp.;

aus der Ordnung der Diptera z.B. *Chrysops* spp., *Tabanus* spp., *Musca* spp., *Hydrotaea* spp., *Muscina* spp., *Haematobosca* spp., *Haematobia* spp., *Stomoxys* spp., *Fannia* spp., *Glossina* spp., *Lucilia* spp., *Calliphora* spp., *Auchmeromyia* spp., *Cordylobia* spp., *Cochliomyia* spp., *Chrysomyia* spp., *Sarcophaga* spp., *Wohlfartia* spp., *Gasterophilus* spp., *Oesteromyia* spp., *Oedemagena* spp., *Hypoderma* spp., *Oestrus* spp., *Rhinoceros* spp., *Melophagus* spp., *Hippobosca* spp..

Aus der Ordnung der Siphonaptera z.B. *Ctenocephalides* spp., *Echidnophaga* spp., *Ceratophyllus* spp..

Besonders hervorgehoben sei die Wirkung gegen Siphonaptera, insbesondere gegen Flöhe.

Bevorzugt genannt seien folgende Zieltiere:

Zu den Nutz- und Zuchttieren gehören Säugetiere wie z.B. Rinder, Pferde, Schafe, Schweine, Ziegen, Kamele, Wasserbüffel, Esel, Kaninchen, Damwild, Rentiere, Pelztierchen wie z.B. Nerze, Chinchilla, Waschbär, Vögel wie z.B. Hühner, Gänse, Puten, Enten.

Zu Labor- und Versuchstieren gehören Mäuse, Ratten, Meerschweinchen, Goldhamster, Hunde und Katzen.

Zu den Hobbytieren gehören Hunde und Katzen.

Die Anwendung kann sowohl prophylaktisch als auch therapeutisch erfolgen.

Die Anwendung der Wirkstoffe erfolgt direkt oder in Form von geeigneten Zubereitungen dermal, durch Behandlung der Umgebung oder mit Hilfe wirkstoffhaltiger Formkörper wie z.B. Streifen, Platten, Bänder, Halsbänder, Ohrmarken, Gießmaßbänder, Markierungsvorrichtungen.

Die dermale Anwendung geschieht z.B. in Form des Badens, Tauchens (Dippen), Sprühens (Sprayen), Aufgießens (pour-on oder spot-on), Waschens, Schamponierens, Begießens, Einpuderns.

Geeignete Zubereitungen sind:

Lösungen oder Konzentrate zur Verabreichung nach Verdünnung, Lösungen zum Gebrauch auf der Haut, Aufgußformulierungen, Gele;

Emulsionen und Suspensionen zur dermalen Anwendung sowie halbfeste Zubereitungen;

Formulierungen, bei denen der Wirkstoff in einer Salbengrundlage oder in einer Öl in Wasser oder Wasser in Öl Emulsionsgrundlage verarbeitet ist;

Feste Zubereitungen wie Pulver, wirkstoffhaltige Formkörper.

Lösungen zum Gebrauch auf der Haut werden aufgeträufelt, aufgestrichen, eingerieben, aufgespritzt, aufgesprüht oder durch Tauchen (Dippen), Baden oder Waschen aufgebracht.

Die Lösungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst wird und evtl. Zusätze wie Lösungsvermittler, Säuren, Basen, Puffersalze, Antioxidantien, Konservierungsmittel

zugefügt werden.

Als Lösungsmittel seien genannt: Physiologisch verträgliche Lösungsmittel wie Wasser, Alkohole wie Ethanol, Butanol, Benzylalkohol, Glycerin, Kohlenwasserstoffe, Propylenglykol, Polyethylenglykole, N-Methylpyrrolidon, sowie Gemische derselben.

- 5 Die Wirkstoffe lassen sich gegebenenfalls auch in physiologisch verträglichen pflanzlichen oder synthetischen Ölen lösen.

Als Lösungsvermittler seien genannt: Lösungsmittel, die die Lösung des Wirkstoffs im Hauptlösungsmittel fördern oder sein Ausfallen verhindern. Beispiele sind Polyvinylpyrrolidon, polyoxyethyliertes Rhizinöl, polyoxyethylierte Sorbitanester.

- 10 Konservierungsmittel sind: Benzylalkohol, Trichlorbutanol, p-Hydroxybenzoesäureester, n-Butanol.

Es kann vorteilhaft sein, bei der Herstellung der Lösungen Verdickungsmittel zuzufügen. Verdickungsmittel sind: Anorganische Verdickungsmittel wie Bentonite, kolloidale Kieselsäure, Aluminiummonostearat, organische Verdickungsmittel wie Cellulosederivate, Polyvinylalkohole und deren Copolymere, Acrylate und Metacrylate.

- 15 Gele, die auf die Haut aufgetragen oder aufgestrichen werden, werden hergestellt indem Lösungen, die wie oben beschrieben hergestellt worden sind, mit soviel Verdickungsmittel versetzt werden, daß eine klare Masse mit salbenartiger Konsistenz entsteht. Als Verdickungsmittel werden die weiter oben angegebenen Verdickungsmittel eingesetzt.

- 20 Aufgießformulierungen werden auf begrenzte Bereiche der Haut aufgegossen oder aufgespritzt, wobei der Wirkstoff sich auf der Körperoberfläche verteilt.

Aufgießformulierungen werden hergestellt, indem der Wirkstoff in geeigneten hautverträglichen Lösungsmitteln oder Lösungsmittelgemischen gelöst, suspendiert oder emulgiert wird. Gegebenenfalls werden weitere Hilfsstoffe wie Farbstoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, Haftmittel zugefügt.

- 25 Als Lösungsmittel seien genannt: Wasser, Alkanole, Glycole, Polyethylenglycole, Polypropylenglycole, Glycerin, aromatische Alkohole wie Benzylalkohol, Phenylethanol, Phenoxyethanol, Ester wie Essigester, Butylacetat, Benzylbenzoat, Ether wie Alkylenglykolalkylether wie Dipropylenglykolmonomethylether, Diethylenglykolmono-butylether, Ketone wie Aceton, Methylethylketon, aromatische und/oder aliphatische Kohlenwasserstoffe, pflanzliche oder synthetische Öle, DMF, Dimethylacetamid, N-Methylpyrrolidon, 2-Dimethyl-4-oxy-methylen-1,3-dioxolan.

- 30 Farbstoffe sind alle zur Anwendung am Tier zugelassenen Farbstoffe, die gelöst oder suspendiert sein können.

Hilfsstoffe sind auch spreitende Öle wie Isopropylmyristat, Dipropylenglykolpelargonat, Silikonöle, Fettsäureester, Triglyceride, Fettalkohole.

- 35 Antioxidantien sind Sulfite oder Metabisulfite wie Kaliummetabisulfit, Ascorbinsäure, Butylhydroxytoluol, Butylhydroxyanisol, Tocopherol.

Lichtschutzmittel sind z.B. Stoffe aus der Klasse der Benzophenone oder Novantisolsäure.

Haftmittel sind z.B. Cellulosederivate, Stärkederivate, Polyacrylate, natürliche Polymere wie Alginate, Gelatine.

Emulsionen sind entweder vom Typ Wasser in Öl oder vom Typ Öl in Wasser.

- 40 Sie werden hergestellt, indem man den Wirkstoff entweder in der hydrophoben oder in der hydrophilen Phase löst und diese unter Zuhilfenahme geeigneter Emulgatoren und gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe wie Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Lichtschutzmittel, viskositäts erhöhende Stoffe, mit dem Lösungsmittel der anderen Phase homogenisiert.

- 45 Als hydrophobe Phase (Öle) seien genannt: Paraffinöle, Silikonöle, natürliche Pflanzenöle wie Sesamöl, Mandelöl, Rizinusöl, synthetische Triglyceride wie Capryl/ Caprinsäure-biglycerid, Triglyceridgemisch mit Pflanzenfettsäuren der Kettenlänge C<sub>8-12</sub> oder anderen speziell ausgewählten natürlichen Fettsäuren, Partialglyceridgemische gesättigter oder ungesättigter eventuell auch hydroxylgruppenhaltiger Fettsäuren, Mono- und Diglyceride der C<sub>8</sub>/C<sub>10</sub>-Fettsäuren.

- 50 Fettsäureester wie Ethylstearat, Di-n-butyryl-adipat, Laurinsäurehexylester, Dipropylenglykolpelargonat, Ester einer verzweigten Fettsäure mittlerer Kettenlänge mit gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C<sub>16</sub>-C<sub>18</sub>, Isopropylmyristat, Isopropylpalmitat, Capryl/Caprinsäureester von gesättigten Fettalkoholen der Kettenlänge C<sub>12</sub>-C<sub>18</sub>, Isopropylstearat, Ölsäureoleylester, Ölsäuredecylester, Ethyloleat, Milchsäureethylester, wachsartige Fettsäureester wie Dibutylphthalat, Adipinsäurediisopropylester, letzterem verwandte Estergemische u.a. Fettalkohole wie Isotridecylalkohol, 2-Octyldodecanol, Cetylstearyl-alkohol, Oleylalkohol.

- 55 Fettsäuren wie z.B. Ölsäure und ihre Gemische.

Als hydrophile Phase seien genannt:

Wasser, Alkohole wie z.B. Propylenglycol, Glycerin, Sorbitol und ihre Gemische.

Als Emulgatoren seien genannt: nichtionogene Tenside, z.B. polyoxyethyliertes Rizinusöl, polyoxyethyliertes Sorbitan-monooleat, Sorbitanmonostearat, Glycerinmonostearat, Polyoxyethylstearat, Alkylphenolpolyglykoether;  
 ampholytische Tenside wie Di-Na-N-lauryl- $\beta$ -iminodipropionat oder Lecithin; anionaktive Tenside, wie Na-Laurylsulfat, Fettalkoholethersulfate, Mono/Dialkylpolyglykoetherorthophosphor-säureester-monoethanolaminsalz;  
 kationaktive Tenside wie Cetyltrimethylammoniumchlorid.

Als weitere Hilfsstoffe seien genannt: Viskositätserhöhende und die Emulsion stabilisierende Stoffe wie Carboxymethylcellulose, Methylcellulose und andere Cellulose- und Stärke-Derivate, Polyacrylate, Alginate, Gelatine, Gummi-arabicum, Polyvinylpyrrolidon, Polyvinylalkohol, Copolymere aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid, Polyethylenglykole, Wachse, kolloidale Kieselsäure oder Gemische der aufgeführten Stoffe.

Suspensionen werden hergestellt, indem man den Wirkstoff in einer Trägerflüssigkeit gegebenenfalls unter Zusatz weiterer Hilfsstoffe wie Netzmittel, Farbstoffe, resorptionsfördernde Stoffe, Konservierungsstoffe, Antioxidantien Lichtschutzmittel suspendiert.

Als Trägerflüssigkeiten seien alle homogenen Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische genannt.

Als Netzmittel (Dispergiermittel) seien die weiter oben angegebene Tenside genannt.

Als weitere Hilfsstoffe seien die weiter oben angegebenen genannt.

Halbfeste Zubereitungen zur dermalen Verabreichung unterscheiden sich von den oben beschriebenen Suspensionen und Emulsionen nur durch ihre höhere Viskosität.

Zur Herstellung fester Zubereitungen wird der Wirkstoff mit geeigneten Trägerstoffen gegebenenfalls unter Zusatz von Hilfsstoffen vermischt und in die gewünschte Form gebracht.

Als Trägerstoffe seien genannt alle physiologisch verträglichen festen Inertstoffe. Alle solche dienen anorganische und organische Stoffe. Anorganische Stoffe sind z.B. Kochsalz, Carbonate wie Calciumcarbonat, Hydrogencarbonate, Aluminiumoxide, Kieselsäuren, Tonerden, gefälltes oder kolloidales Siliciumdioxid, Phosphate.

Hilfsstoffe sind Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Farbstoffe, die bereits weiter oben aufgeführt worden sind.

Weitere geeignete Hilfsstoffe sind Schmier- und Gleitmittel wie z.B. Magnesiumstearat, Stearinsäure, Talkum, Bentonite.

Anwendungsfertige Zubereitungen enthalten den Wirkstoff in Konzentrationen von 1 ppm - 20 Gewichtsprozent, bevorzugt von 0,01 - 10 Gewichtsprozent.

Zubereitungen die vor Anwendung verdünnt werden, enthalten den Wirkstoff in Konzentrationen von 0,5 - 90 Gewichtsprozent, bevorzugt von 1 bis 50 Gewichtsprozent.

Im allgemeinen hat es sich als vorteilhaft erwiesen, Mengen von etwa 0,5 bis etwa 50 mg, bevorzugt 1 bis 20 mg, Wirkstoff je kg Körpergewicht pro Tag zur Erzielung wirksamer Ergebnisse zu verabreichen.

Besonders hervorgehoben sei die Anwendung über Formkörper. Formkörper sind u.a. Halsbänder, Anhänger für Halsbänder (Medaillons), Ohrmarken, Bänder zur Befestigung an Gliedmaßen oder Körperteilen, Klebestreifen und -folien, Abziehfolien.

Besonders hervorgehoben seien Halsbänder und Medaillons.

Für die Herstellung der Formkörper kommen thermoplastische und flexible hitzehärtbare Kunststoffe sowie Elastomere und thermoplastische Elastomere in Frage. Als solche seien genannt Polyvinylharze, Polyurethane, Polyacrylate, Epoxyharze, Cellulose, Cellulosederivate, Polyamide und Polyester, die mit den obengenannten Wirkstoff ausreichend verträglich sind. Die Polymeren müssen eine ausreichende Festigkeit und Biegsamkeit haben, um beim Formen nicht zu reißen oder brüchig zu werden. Sie müssen von ausreichender Haltbarkeit sein, um gegen normale Abnutzung beständig zu sein. Außerdem müssen die Polymere eine ausreichende Wanderung des Wirkstoffs an die Oberfläche des Formkörpers zulassen.

Zu den Polyvinylharzen gehören Polyvinylhalogenide, wie Polyvinylchlorid, Polyvinylchlorid-Vinylacetat und Polyvinylfluorid; Polyacrylat- und Polymethacrylatester, wie Polymethylacrylat und Polymethylmethacrylat; und Polyvinylbenzole, wie Polystyrol und Polyvinyltoluol. Besonders hervorgehoben sei Polyvinylchlorid.

Für die Herstellung der Formkörper auf der Basis Polyvinylharz sind die Weichmacher geeignet, die üblicherweise zum Weichmachen von festen Vinylharzen verwendet werden. Der zu verwendende Weichmacher hängt von dem Harz und seiner Verträglichkeit mit dem Weichmacher ab. Geeignete Weichmacher sind beispielsweise Ester von Phosphorsäure, wie Ester von Phthalsäure, wie Dimethylphthalat und Dioctylphthalat, und Ester von Adipinsäure, wie Diisobutyladipat. Es können auch andere Ester, wie die Ester von Azelainsäure, Maleinsäure, Ricinolsäure, Myristinsäure, Palmitinsäure, Ölsäure, Sebacinsäure, Stearinsäure und Trimellithsäure, sowie komplexe lineare Polyester, polymere Weichmacher und epoxydier-



te Sojabohnenöle verwendet werden. Die Menge des Weichmachers beträgt etwa 10 bis 50 Gew.-%, vorzugsweise etwa 20 bis 45 Gew.-% der gesamten Zusammensetzung.

In den Formkörpern können noch weitere Bestandteile, wie Stabilisierungsmittel, Schmiermittel, Füllstoffe und Färbematerialien, enthalten sein, ohne daß dadurch die grundlegenden Eigenschaften der Zusammensetzung verändert werden. Geeignete Stabilisierungsmittel sind Antioxydationsmittel und Mittel, die die Bänder vor ultravioletter Strahlung und unerwünschtem Abbau während der Bearbeitung, wie Strangpressen schützen. Einige Stabilisierungsmittel, wie epoxydierte Sojabohnenöle, dienen außerdem als sekundäre Weichmacher. Als Schmiermittel können beispielsweise Stearate, Stearinsäure und Polyethylene mit niedrigem Molekulargewicht verwendet werden. Diese Bestandteile können in einer Konzentration bis zu etwa 5 Gew.-% der gesamten Zusammensetzung verwendet werden.

Bei der Herstellung der Formkörper auf Vinylbasis werden die verschiedenen Bestandteile nach bekannten Verfahren gemischt und nach bekannten Strangpreß- oder Spritzgußverfahren formgepreßt.

Die Wahl des Verarbeitungsverfahrens zur Herstellung der Formkörper richtet sich technisch grundsätzlich nach den rheologischen Eigenschaften des Bandmaterials und der Form des gewünschten Bandes. Die Verarbeitungsverfahren können nach der Verarbeitungstechnologie oder nach der Art der Formgebung eingestellt werden. Bei der Verfahrenstechnologie kann man die Verfahren nach den bei ihnen durchlaufenden rheologischen Zuständen unterteilen. Danach kommen für viskose Bandmaterialien Gießen, Pressen, Spritzgießen und Auftragen und für elastoviskose Polymere Spritzgießen, Strangpressen (Extrudieren), Kalandrieren, Walzen und gegebenenfalls Kanten in Frage. Nach Art der Formgebung eingeteilt, lassen sich die erfindungsgemäßen Formkörper durch Gießen, Tauchen, Pressen, Spritzgießen, Extrudieren, Kalandrieren, Prägen, Biegen, Tiefziehen etc. herstellen.

Diese Verarbeitungsverfahren sind bekannt und bedürfen keiner näheren Erklärung. Im Prinzip gelten für andere Polymere die Erläuterungen, die oben beispielhaft für Polyvinylharze gemacht wurden.

Die als Trägermaterial dienenden Polyurethane werden in an sich bekannter Weise durch Umsetzung  
25 von Polyisocyanaten mit höhermolekularen, mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen  
Gruppen aufweisenden Verbindungen sowie gegebenenfalls niedermolekularen Kettenverlängerungsmitteln  
und/oder monofunktionellen Kettenabbrechern hergestellt.

Als Ausgangskomponenten bei der Herstellung der Polyurethane kommen aliphatische, cycloaliphatische, araliphatische, aromatische und heterocyclische Polyisocyanate in Betracht, wie sie z.B. von W. Siefken in Liebig's Annalen der Chemie, 562, Seiten 75 bis 136, beschrieben werden. Beispielhaft seien genannt: Ethylen-diisocyanat, 1,4-Tetramethylen-diisocyanat, 1,6-Hexamethylen-diisocyanat, 1,12-Dodecandiisocyanat, Cyclobutan-1,3-diisocyanat, Cyclohexan-1,3- und -1,4-diisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Verbindungen, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethyl-cyclohexan (s. DE-AS 202 785 und US-PS 3 401 190), 2,4- und 2,6-Hexahydrotoluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Verbindungen; Hexahydro-1,3- und/oder -1,4-phenylen-diisocyanat, Perhydro-2,4'- und/oder -4,4'-diphenylmethan-diisocyanat, 1,3- und 1,4-Phenylen-diisocyanat, 2,4- und 2,6-Toluylendiisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Verbindungen; Diphenylmethan-2,4'-und/oder -4,4'-diisocyanat, Naphthylen-1,5-diisocyanat, Triphenylmethan-4,4', 4"-triisocyanat, Polyphenyl-polymethylen-polyisocyanate, wie sie durch Anilin-Formaldehyd-Kondensation und anschließende Phosgenierung erhalten und z.B. in den GB-PSen 874 430 und 848 671 beschrieben werden; m- und p-Isocyanatophenol-sulfonyl-isocyanate gemäß der US-PS 3 454 606; perchlorierte Arylpolyisocyanate, wie sie z.B. in der DE-AS 1 157 601 und in der US-PS 3 277 138 beschrieben werden; Carbodiimidgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie in der DE-PS 1 092 007 und in der US-PS 3 152 162 beschrieben werden; Diisocyanate, wie sie in der US-PS 3 492 330 beschrieben werden; Allophanatgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der GB-PS 994 890, der DE-PS 761 626 und der veröffentlichten holländischen Patentanmeldung 7 102 524 beschrieben werden; Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der US-PS 3 001 973, in den DE-PSen 1 022 789, 1 222 067 und 1 027 394 sowie in den DE-OSen 1 929 034 und 2 004 048 beschrieben werden; Urethangruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der DE-PS 752 261 oder in der US-PS 3 394 164 beschrieben werden; acylierte Harnstoffgruppen aufweisende Polyisocyanate gemäß der DE-PS 1 230 778; Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in der DE-PS 1 101 394, in den US-PSen 3 124 605 und 3 201 372, sowie in der GB-PS 889 050 beschrieben werden; durch Telomerisationsreaktionen hergestellte Polyisocyanate, wie sie z.B. in der US-PS 3 654 106 beschrieben werden; Estergruppen aufweisende Polyisocyanate, wie sie z.B. in den GB-PSen 965 474 und 1 072 956, in der US-PS 3 567 763 und in der DE-PS 1 231 688 genannt werden; Umsetzungsprodukte der obengenannten Isocyanate mit Acetalen gemäß der DE-PS 1 072 385 und polymere Fettsäurereste enthaltene Polyisocyanate gemäß der US-PS 3 455 883.

Es ist auch möglich, die bei der technischen Isocyanatherstellung anfallenden, Isocyanatgruppen aufweisenden Destillationsrückstände, gegebenenfalls gelöst in einem oder mehreren der vorgenannten

Polyisocyanaten, einzusetzen. Ferner ist es möglich, beliebige Mischungen der vorgenannten Polyisocyanate zu verwenden.

Bevorzugte Polyisocyanate sind im allgemeinen die Toluylendiisocyanate und die Diphenylmethandiisocyanate.

- 5 Ausgangskomponenten für die Herstellung der Polyurethane sind ferner Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen mit einem Molekulargewicht in der Regel von 400 - 10 000. Hierunter versteht man neben Aminogruppen, Thiolgruppen oder Carboxylgruppen aufweisenden Verbindungen vorzugsweise Polyhydroxylverbindungen, insbesondere zwei bis acht Hydroxylgruppen aufweisende Verbindungen, speziell solche vom Molekulargewicht 800 bis 10 000, vorzugsweise  
 10 1 000 bis 6 000, z.B. mindestens zwei, in der Regel 2 - 8, vorzugsweise aber 2 - 4, Hydroxylgruppen aufweisende Polyester, Polyether, Polythioether, Polyacetale, Polycarbonate und Polyesteramide, wie sie für die Herstellung von homogenen und von zellförmigen Polyurethanen an sich bekannt sind.

- Die in Frage kommenden Hydroxylgruppen aufweisenden Polyester sind z.B. Umsetzungsprodukte von mehrwertigen, vorzugsweise zweiwertigen und gegebenenfalls zusätzlich dreiwertigen, Carbonsäuren. An-  
 15 stelle der freien Polycarbonsäuren können auch die entsprechenden Polycarbonsäureanhydride oder entsprechenden Polycarbonsäureester von niedrigen Alkoholen oder deren Gemische zur Herstellung der Polyester verwendet werden. Die Polycarbonsäuren können aliphatischer, cycloaliphatischer, aromatischer und/oder heterocyclischer Natur sein und gegebenenfalls, z.B. durch Halogenatome, substituiert und/oder ungesättigt sein.

- 20 Als Beispiele hierfür seien genannt: Bernsteinsäure, Adipinsäure, Korksäure, Azelainsäure, Sebacinsäure, Phthalsäure, Isophthalsäure, Trimellitsäure, Phthalsäureanhydrid, Tetrahydrophthalsäureanhydrid, Hexahydrophthalsäureanhydrid, Tetrachlorphthalsäureanhydrid, Endomethylen-tetrahydrophthalsäureanhydrid, Glutarsäureanhydrid, Maleinsäure, Maleinsäureanhydrid, Fumarsäure, dimere und trimere Fettsäuren wie Ölsäure, gegebenenfalls in Mischung mit monomeren Fettsäuren, Terephthalsäuredimethylester und Te-  
 25 repthalsäure-bis-glykolester.

- Als mehrwertige Alkohole kommen z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol-(1,2) und - (1,3), Butylenglykol-(1,4) und -(2,3), Hexandiol-(1,6), Octandiol-(1,8), Neopentylglykol, Cyclohexandimethanol(1,4-Bis-hydroxymethylcyclohexan), 2-Methyl-1,3-propandiol, Glycerin, Trimethylolpropan, Hexantriol-(1,2,6), Butantriol-(1,2,4), Trimethyläthan, Pentaerythrit, Chinit, Mannit und Sorbit, Methylglykosit, ferner Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykole, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole, Dibutylenglykol und Polybutylenglykole in Frage. Die Polyester können anteilig endständige Carboxylgruppen aufwei-  
 30 sen. Auch Polyester aus Lactonen, z.B.  $\epsilon$ -Caprolacton oder Hydroxycarbonsäuren, z.B.  $\omega$ -Hydroxycapronsäure, sind einsetzbar.

- Als mehrwertige Alkohole kommen infrage Polyether die mindestens zwei, in der Regel zwei bis acht, vorzugsweise zwei bis drei, Hydroxylgruppen aufweisen. Diese sind an sich bekannt und werden z.B. durch Polymerisation von Epoxiden wie Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid, Tetrahydrofuran, Styroloxid oder Epichlorhydrin mit sich selbst, z.B. in Gegenwart von  $\text{BF}_3$  oder durch Anlagerung dieser Epoxide, gegebenenfalls im Gemisch oder nacheinander, an Startkomponenten mit reaktionsfähigen Wasserstoffato-  
 35 men wie Wasser, Alkohole, Ammoniak oder Amine, z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol-(1,3) oder -(1,2), Trimethylolpropan, 4,4'-Dihydroxy diphenylpropan, Anilin, Ethanolamin oder Ethylendiamin hergestellt. Auch Sacrosepolyether, wie sie z.B. in den DE-ASen 1 176 358 und 1 064 938 beschrieben werden, kommen in Frage. Vielfach sind solche Polyether bevorzugt, die überwiegend (bis zu 90 Gew.-%, bezogen auf alle vorhandenen OH-Gruppen im Polyether) primäre OH-Gruppen aufweisen. Auch durch Vinylpolymerisate modifizierte Polyether, wie sie z.B. durch Polymerisation von Styrol und Acrylnitril in Gegenwart von  
 40 Polyethern entstehen (US-PSen 3 383 351, 3 304 273, 3 523 093, 3 110 695, deutsche Patentschrift 1 152 536), sind geeignet, ebenso OH-Gruppen aufweisende Polybutadiene.

- Unter den Polythioethern seien insbesondere die Kondensationsprodukte an Thiodiglykol mit sich selbst und/oder mit anderen Glykolen, Dicarbonsäuren, Formaldehyd, Aminocarbonsäuren oder Aminoalkoholen angeführt. Je nach den Co-Komponenten handelt es sich bei den Produkten um Polythiomischether,  
 50 Polythioetherester oder Polythioetheresteramide.

Als Polyacetale kommen z.B. die aus Glykolen, wie Diethylenglykol, Triethylenglykol, 4,4'-Dioxethoxydiphenyldimethylmethan, Hexandiol und Formaldehyd herstellbaren Verbindungen in Frage. Auch durch Polymerisation cyclischer Acetale lassen sich erfindungsgemäß g eignete Polyacetale herstellen.

- Als Hydroxylgruppen aufweisende Polycarbonate kommen solche der an sich bekannten Art in Betracht,  
 55 die z.B. durch Umsetzung von Diolen wie Propandiol(1,3), Butandiol-(1,4) und/oder Hexandiol-(1,6), Diethylenglykol, Triethylenglykol oder Tetraethylenglykol mit Diarylcarbonaten, z.B. Diphenylcarbonat, oder Phosgen hergestellt werden können.

Zu den Polyesteramiden und Polyamiden zählen z.B. die aus mehrwertigen gesättigten und ungesättigten Carbonsäuren bzw. deren Anhydriden und mehrwertigen gesättigten und ungesättigten Aminoalkoholen, Diaminen, Polyaminen und ihren Mischungen gewonnenen, vorwiegend linearen Kondensate.

Auch bereits Urethan- oder Harnstoffgruppen enthaltene Polyhydroxylverbindungen sowie gegebenenfalls modifizierte natürliche Polyole, wie Rizinusöl, Kohlenhydrate oder Stärke, sind verwendbar. Auch Anlagerungsprodukte von Alkylenoxiden an Phenol-Formaldehyd-Harze oder auch an Harnstoff-Formaldehydharze sind erfindungsgemäß einsetzbar.

Vertreter dieser Verbindungen sind z.B. in High Polymers, Vol. XVI, "Polyurethans, Chemistry and Technology", verfaßt von Saunders-Frisch, Interscience Publishers, New York, London, Band I, 1962, Seiten 32 - 42 und Seiten 44 - 54 und Band II, 1964, Seiten 5 - 6 und 198 - 199, sowie im Kunststoff-Handbuch, Band VII, Vieweg-Höchtlen, Carl-Hanser-Verlag, München, 1966, z.B. auf den Seiten 45 - 71, beschrieben.

Selbstverständlich können Mischungen der obengenannten Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen mit einem Molekulargewicht von 400 - 10 000, z.B. Mischungen von Polyethern, eingesetzt werden.

Als gegebenenfalls einzusetzende Ausgangskomponenten kommen auch Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen von einem Molekulargewicht 32 - 400 in Frage. Auch in diesem Fall versteht man hierunter Hydroxylgruppen und/oder Aminogruppen und/oder Thiolgruppen und/oder Carboxylgruppen aufweisende Verbindungen, vorzugsweise Verbindungen, die als Kettenverlängerungsmittel oder Vernetzungsmittel dienen. Diese Verbindungen weisen in der Regel 2 bis 8 gegenüber Isocyanaten reaktionsfähige Wasserstoffatome auf, vorzugsweise 2 oder 3 reaktionsfähige Wasserstoffatome.

Als Beispiele für derartige Verbindungen seien genannt: Ethylenglykol, Propylenglykol-(1,2) und -(1,3), Butylenglykol-(1,4) und -(2,3), Pentandiol-(1,5), Hexandiol-(1,6), Octandiol-(1,8), Neopentylglykol, 1,4-Bis-hydroxymethyl-cyclohexan, 2-Methyl-1,3-propandiol, Glycerin, Trimethylolpropan, Hexantriol-(1,2,6), Trimethyloläthan, Pentaerythrit, Chinit, Mannit und Sorbit, Diethylenglykol, Triethylenglykol, Tetraethylenglykol, Polyethylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 400, Dipropylenglykol, Polypropylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 400, Dibutylenglykol, Polybutylenglykole mit einem Molekulargewicht bis 400, 4,4'-Dihydroxy-diphenylpropan, Di-hydroxymethylhydrochinon, Äthanolamin, Diäthanolamin, Triäthanolamin, 3-Aminopropanol, Ethylendiamin, 1,3-Diaminopropan, 1-Mercapto-3-aminopropan, 4-Hydroxy- oder -Amino-phthalsäure, Bernsteinsäure, Adipinsäure, Hydrazin, N,N'-Dimethylhydrazin, 4,4'-Diaminodiphenylmethan, Toluylendiamin, Methylen-bis-chloranilin, Methylen-bis-anthrilsäureester, Diaminobenzoesäureester und die isomeren Chlorphenyldiamine.

Auch in diesem Fall können Mischungen von verschiedenen Verbindungen mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktionsfähigen Wasserstoffatomen mit einem Molekulargewicht von 32 - 400 verwendet werden.

Es können jedoch auch Polyhydroxylverbindungen eingesetzt werden, in welchen hochmolekulare Polyaddukte bzw. Polykondensate in feindisperser oder gelöster Form enthalten sind. Derartige modifizierte Polyhydroxylverbindungen werden erhalten, wenn man Polyadditionsreaktionen (z.B. Umsetzungen zwischen Polyisocyanaten und aminofunktionellen Verbindungen) bzw. Polykondensationsreaktionen (z.B. zwischen Formaldehyd und Phenolen und/oder Aminen) direkt in situ in den oben genannten, Hydroxylgruppen aufweisenden Verbindungen ablaufen läßt. Derartige Verfahren sind beispielsweise in den DE-Asen 1 168 075 und 1 260 142, sowie den DE-OSen 2 324 134, 2 423 984, 2 512 385, 2 513 815, 2 550 797, 2 550 833 und 2 550 862 beschrieben. Es ist aber auch möglich, gemäß US-PS 3 869 413 bzw. DE-OS 2 550 860 eine fertige wässrige Polymerdispersion mit einer Polyhydroxylverbindung zu vermischen und anschließend aus dem Gemisch das Wasser zu entfernen.

Bei der Auswahl der für die Herstellung des Polyurethans verwendeten höhermolekularen Polyolkomponente ist zu beachten, daß das fertige Polyurethan in Wasser nicht quellbar sein soll. Die Verwendung eines Überschusses an Polyhydroxylverbindungen mit Ethylenoxideinheiten (Polyethylenglykolpolyether oder Polyester mit Diethylen- oder Triethylenglykol als Diolkomponente) ist daher zu vermeiden.


Besonders hervorgehoben zur Herstellung der Formkörper seien thermoplastische Elastomere. Dies sind Werkstoffe, die elastomere Phasen in thermoplastisch verarbeitbaren Polymeren entweder physikalisch eingemischt oder chemisch eingebunden enthalten. Man unterscheidet Polymerblends, in denen die elastomeren Phasen Bestandteil des polymeren Gerüsts sind. Durch den Aufbau der thermoplastischen Elastomere liegen harte und weiche Bereiche nebeneinander vor. Die harten Bereiche bilden dabei eine kristalline Netzstruktur oder eine kontinuierliche Phase deren Zwischenräume von elastomeren Segmenten ausgefüllt sind. Aufgrund dieses Aufbaus haben diese Werkstoffe kautschukähnliche Eigenschaften.

Man kann 5 Hauptgruppen der thermoplastischen Elastomere unterscheiden:

1. Copolyester

2. Polyether-Block-Amide (PEBA)
  3. Thermoplastische Polyurethane (TPU)
  4. Thermoplastische Polyolefine (TPO)
  5. Styrol-Block Copolymere
- 5 Geeignete Copolyester (segmentierte Polyesterelastomere) sind beispielsweise aus einer Vielzahl wiederkehrender, kurzkettiger Estereinheiten und langkettiger Estereinheiten, die durch Esterbindungen vereinigt sind, aufgebaut, wobei die kurzkettigen Estereinheiten etwa 15-65 Gew.-% des Copolyesters ausmachen und die Formel I haben.

10



Formel I

15

in welcher


R für einen zweiwertigen Rest einer Dicarbonsäure steht, der ein Molekulargewicht von unter etwa 350 hat,

D für einen zweiwertigen Rest eines organischen Diols steht, der ein Molekulargewicht von unter etwa 250 hat,

20

Die langkettigen Estereinheiten machen etwa 35-85 Gew.-% des Copolyesters aus und haben die Formel II

25



Formel II

in welcher

30 R für einen zweiwertigen Rest einer Dicarbonsäure steht, der ein Molekulargewicht von unter etwa 350 hat,

G für einen zweiwertigen Rest eines langkettigen Glykols steht, das ein durchschnittliches Molekulargewicht von etwa 350 bis 6000 hat.

Die erfindungsgemäß verwendbaren Copolyester sind herstellbar, indem man miteinander a) eine oder mehrere Dicarbonsäuren, b) ein oder mehrere lineare, langkettige Glykole und c) ein oder mehrere niedermolekulare Diole polymerisiert.

Die Dicarbonsäuren für die Herstellung des Copolyesters können aromatisch, aliphatisch oder cycloaliphatisch sein. Die bevorzugten Dicarbonsäuren sind die aromatischen Säuren mit 8-16 C-Atomen, insbesondere Phthaldicarbonsäuren, wie Phthal-, Terephthal- und Isophthalsäure.

40 Die niedermolekularen Diole für die Umsetzung zur Bildung der kurzkettigen Estereinheiten der Copolyester gehören den Klassen der acyclischen, alicyclischen und aromatischen Dihydroxyverbindungen an. Die bevorzugten Diole haben 2-15 C-Atome, wie Ethylen-, Propylen-, Tetramethylen-, Isobutylen-, Pentamethylen-, 2,2-Dimethyltrimethylen-, Hexamethylen- und Decamethylenglykole, Dihydroxycyclohexan, Cyclohexandimethanol, Resorcin, Hydrochinon und dergleichen. Zu den Bisphenolen für den vorliegenden Zweck gehören Bis-(p-hydroxy)-diphenyl, Bis-(p-hydroxyphenyl)-methan, Bis-(p-hydroxyphenyl)-ethan und Bis-(p-hydroxyphenyl)-propan.

Die langkettigen Glycole zur Herstellung der weichen Segmente der Copolyester haben vorzugsweise Molekulargewichte von etwa 600 bis 3000. Zu ihnen gehören Poly-(alkylenether)-glycole, bei denen die Alkylengruppen 2-9 Kohlenstoffatome aufweisen.

50 Auch Glycolester von Poly-(alkylenoxid)-dicarbonsäuren können als langkettiges Glycol Verwendung finden.

Auch Polyesterglycole können als langkettiges Glycol Verwendung finden.


Zu den langkettigen Glycolen gehören auch Polyformale, die durch Umsetzung von Formaldehyd mit Glycolen erhalten werden. Auch Polythioetherglycole sind geeignet. Polybutadien- und Polyisopren glycole, 55 Mischpolymere derselben und gesättigte Hydrierungsprodukte dieser Materialien stellen zufriedenstellende langkettige polymere Glycole dar.

Verfahren zur Synthese derartiger Copolyester sind aus DOS 2 239 271, DOS 2 213 128, DOS 2 449 343 und US-P 3 023 192 bekannt.

Geeignete Copolyester sind z.B. unter den Handelsnamen ®Hytrel der Fa. Du Pont, ®Pelpren der Fa. Toyobo®, Arnitel der Fa. Akzo, ®Ectel der Fa. Eastman Kodak und ®Riteflex der Fa. Hoechst erhältlich.

Geeignete Polyether-Blockamide sind beispielsweise solche, die aus Polymerketten bestehen, die aus wiederkehrenden Einheiten entsprechend der Formel I aufgebaut sind.

5



Formel I

10

in welcher

- A die von einem Polyamid mit 2 Carboxylendgruppen durch Verlust der letzteren abgeleitete Polyamidkette ist und  
 B die von einem Polyoxyalkylenglycol mit endständigen OH-Gruppen durch Verlust der letzteren abgeleitete Polyoxyalkylenglycolkette ist und  
 n die Zahl der die Polymerkette bildenden Einheiten ist.

Als Endgruppen stehen dabei bevorzugt OH-Gruppen oder Reste von Verbindungen die die Polymerisation abbrechen.

Die Dicarbonsäurepolyamide mit den endständigen Carboxylgruppen werden auf bekannte Weise erhalten, so z.B. durch Polykondensation eines oder mehrerer Lactame oder/und einer oder mehrerer Aminosäure, ferner durch Polykondensation einer Dicarbonsäure mit einem Diamin, jeweils in Gegenwart eines Überschusses einer organischen Dicarbonsäure, vorzugsweise mit endständigen Carboxylgruppen. Diese Carbonsäuren werden während der Polykondensation Bestandteil der Polyamidkette und lagern sich insbesondere an den Ende derselben an, wodurch man ein  $\alpha$ - $\omega$ -dicarbonsaures Polyamid erhält. Ferner wirkt die Dicarbonsäure als Kettenabbruchmittel, weshalb sie auch im Überschuß eingesetzt wird.

Das Polyamid kann erhalten werden, ausgehend von Lactamen und/oder Aminosäuren mit einer Kohlenwasserstoffkette bestehend aus 4-14 C-Atomen, wie z.B. von Caprolactam, Oenantholactam, Dodekalactam, Undekanolactam, Dekanolactam, 11-Amino-undekano oder 12-Aminododekansäure.

Als Beispiele für Polyamide, wie sie durch Polykondensation einer Dicarbonsäure mit einem Diamin entstehen, können genannt werden die Kondensationsprodukte aus Hexamethyldiamin mit Adipin-, Azelain-, Sebacin-, und 1,12-Dodecandisäure, sowie die Kondensationsprodukte aus Nonamethyldiamin und Adipinsäure.

Bei den zur Synthese des Polyamids, das heißt, einerseits zur Fixierung jeweils einer Carboxylgruppe an jedem Ende der Polyamidkette und andererseits als Kettenabbruchmittel verwendeten Dicarbonsäure kommen solche mit 4-20 C-Atomen in Frage, insbesondere Alkandisäuren, wie Bernstein-, Adipin-, Kork-, Azelain-, Sebacin-, Undekandi- oder Dodekandisäure, ferner cycloaliphatische oder aromatische Dicarbonsäure, wie Terephthal- oder Isophthal- oder Cyclohexan-1,4-dicarbonsäure.

Die endständigen OH-Gruppen aufweisenden Polyoxyalkylenglycole sind unverzweigt oder verzweigt und weisen einen Alkylrest mit mindestens 2 C-Atomen auf. Insbesondere sind dies Polyoxyethylen-, Polyoxypropylen- und Polyoxytetramethylenglycol, sowie Copolymerisate davon.

Das Durchschnittsmolekulargewicht dieser OH-Gruppen-terminierten Polyoxyalkylenglycole kann sich in einem großen Bereich bewegen, vorteilhaft liegt es zwischen 100 und 6000, insbesondere zwischen 200 und 3000.

Der Gewichtsanteil des Polyoxyalkylenglycols, bezogen auf das Gesamtgewicht des zur Herstellung des PEBA-Polymeren verwendeten Polyoxyalkylenglycols und Dicarbonsäurepolyamids beträgt 5-85 % vorzugsweise 10-50 %.

Verfahren zur Synthese derartiger PEBA-Polymerer sind aus FR-PS 7 418 913 (Nr. der Veröffentlichung 2 273 021), DOS 2 802 989, DOS 2 837 687, DOS 2 523 991, EP-S 0 095 893, DOS 2 712 987 beziehungsweise DOS 2 716 004 bekannt.

Bevorzugt geeignet sind solche PEBA-Polymere, die im Gegensatz zu den vorher beschriebenen, statistisch aufgebaut sind. Zur Herstellung dieser Polymere wird ein Gemisch aus

1. einer oder mehrerer polyamidbildender Verbindungen aus der Gruppe der  $\omega$ -Aminocarbonsäuren beziehungsweise Lactame mit mindestens 10 Kohlenstoffatomen,
  2. einem  $\alpha$ - $\omega$ -Dihydroxy-Polyoxyalkylenglycol,
  3. mindestens einer organischen Dicarbonsäure
- in einem Gewichtsverhältnis von 1:(2+3) zwischen 30:70 und 98:2, wobei in (2+3) Hydroxyl- und

Carbonylgruppen in äquivalenten Mengen vorliegen, in Gegenwart von 2 bis 30 Gewichtsprozent Wasser, bezogen auf die polyamidbildenden Verbindungen der Gruppe 1, unter dem sich einstellenden Eigen-  
druck auf Temperaturen zwischen 23 °C und 30 °C erhitzt und anschließend nach Entfernen des  
Wassers unter Ausschluß von Sauerstoff bei Normaldruck oder unter vermindertem Druck bei 250 bis

5 280 °C weiterbehandelt werden.

Solche bevorzugt geeignete PEBA-Polymere sind z.B. in DE-OS 2 712 987 beschrieben.

Geeignete und bevorzugt geeignete PEBA-Polymere sind z.B. unter den Handelsnamen ®PEBAX der  
Fa. Atochem, ®Vestamid der Fa. Hüls AG, ®Grilamid der Fa. EMS-Chemie und ®Kellaflex der Fa. DSM  
erhältlich.

10 Die Formkörper enthalten Wirkstoff in Konzentrationen von 1 bis 20 Gew.-%, bevorzugt von 5 bis 20  
Gew.-%, besonders bevorzugt um 10 Gew.-%.

Im Fall von Halsbändern liegt die Konzentration der Wirkstoffe bevorzugt bei 1 bis 15 %; im Fall von  
Medaillons, Anhängern und Ohrmarken bevorzugt bei 5 bis 20 %, im Fall von Folien, Klebestreifen  
bevorzugt bei 0,1 bis 5 %.

15 Die Wirkstoffe können in den Zubereitungen und Formkörpern in Mischung mit Synergisten oder  
anderen Wirkstoffen vorliegen. Zu den Wirkstoffen gehören Insektizide wie phosphorhaltige Verbindungen,  
d.h. Phosphor- oder Phosphorsäureester, natürliche oder synthetische Pyrethroide, Carbamate, Amidine,  
Juvenilhormone und juvenoide synthetische Wirkstoffe.


Zu den Phosphor- oder Phosphorsäureestern gehören:

20 0-Ethyl-0-(8-chinoly)phenyl-thiophosphat (Quintiofos),  
0,0-Diethyl-0-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl)-thiophosphat (Coumaphos),  
0,0-Diethyl-0-phenylglyoxylonitril-oxim-thiophosphat (Phoxim),  
0,0-Diethyl-0-cyanochlorbenzaldoxim-thiophosphat (Chlorphoxim),  
0,0-Diethyl-0-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl)-phosphorothionat (Bromophos-ethyl),  
25 0,0,0',0'-Tetraethyl-S,S'-methylene-di(phosphorodithionat) (Ethion),  
2,3-p-Dioxanedithiol-S,S-bis(0,0-diethylphosphorodithionat),  
2-Chlor-1-(2,4-dichlorphenyl)-vinyl-diethylphosphat (Chlorfenvinphos),  
0,0-Dimethyl-0-(3-methyl-4-methylthiophenyl)-thionophosphorsäureester (Fenthion).

Zu den Carbamaten gehören:

30 2-Isopropoxyphenylmethylcarbammat (Propoxur),  
1-Naphthyl-N-methylcarbammat (Carbaryl).

Zu den synthetischen Pyrethroiden zählen Verbindungen der Formel I



in welcher

R<sup>1</sup> und R<sup>2</sup> für Halogen, gegebenenfalls halogensubstituiertes Alkyl, gegebenenfalls halogensubstitu-  
iertes Phenyl stehen,  
45 R<sup>3</sup> für Wasserstoff oder CN steht,  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Halogen steht,  
R<sup>5</sup> für Wasserstoff oder Halogen steht,

Bevorzugt sind synthetische Pyrethroide der Formel I in welcher

50 R<sup>1</sup> für Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom steht,  
R<sup>2</sup> für Halogen, insbesondere Fluor, Chlor, Brom, Trihalogenmethyl, Phenyl, Chlorphenyl steht,  
R<sup>3</sup> für Wasserstoff oder CN steht,  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Fluor steht,  
R<sup>5</sup> für Wasserstoff steht.

Besonders bevorzugt sind synthetische Pyrethroide der Form I I in welcher

55 R<sup>1</sup> für Chlor steht,  
R<sup>2</sup> für Chlor, Trifluormethyl, p-Chlorphenyl steht,  
R<sup>3</sup> für CN steht,  
R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Fluor steht,

R<sup>5</sup> für Wasserstoff steht.

Insbesondere seien Verbindungen der Formel I genannt in welcher

R<sup>1</sup> für Chlor steht,

R<sup>2</sup> für Chlor oder p-Chlorphenyl steht,

5 R<sup>3</sup> für CN steht,

R<sup>4</sup> für Fluor in 4-Stellung steht,

R<sup>5</sup> für Wasserstoff steht.

Im Einzelnen seien genannt:

3-[2-(4-Chlorphenyl)-2-chlorvinyl]-2,2-dimethyl-cyclo-propancarbonsäure [( $\alpha$ -cyano-4-fluor-3-phenoxy)-benzyl]-ester (Flumethrin),

10 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-cyclopropancarbonsäure- $\alpha$ -cyano(4-fluor-3-phenoxy)-benzyl-ester (Cyfluthrin) und seine Enantiomere und Stereomere,

$\alpha$ -Cyano-3-phenoxybenzyl( $\pm$ )-cis, trans-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Deltamethrin),

15 2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-cyclopropancarbonsäure- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzylester (Cypermethrin),

3-Phenoxybenzyl( $\pm$ )-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Permethrin),

$\alpha$ -(p-Cl-phenyl)-isovaleriansäure- $\alpha$ -cyano-3-phenoxy-benzylester (Fenvalerate),

2-Cyano-3-phenoxybenzyl-2-(2-chlor- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluor-p-toluidino)-3-methylbutyrat (Fluvalinate).

Zu den Amidinen gehören:




20 3-Methyl-2-[2,4-dimethyl-phenylimino]-thiazolin,


2-(4-Chlor-2-methylphenylimino)-3-methylthiazolidin,

2-(4-Chlor-2-methylphenylimino)-3-(isobutyl-1-enyl)-thiazolidin

1,5-Bis-(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1,3,5-triazapenta-1,4-dien (Amitraz).


25 Zu den Juvenilhormonen oder juvenilhormonartigen Substanzen gehören substituierte Diarylether, Benzoylharnstoffe und Triazinderivate. Zu den Juvenilhormonen und juvenilhormonartigen Substanzen gehören insbesondere Verbindungen der folgenden Formeln:





Zu den substituierten Diarylethern gehören insbesondere substituierte Alkoxydiphenylether oder -diphenylmethane der allgemeinen Formel I

25



35 wobei

- R<sup>1</sup> für Wasserstoff, Halogen, Alkyl, Alkoxy, Alkylthio, Halogenalkyl, Halogenalkoxy, Halogenalkylthio, Dioxyalkylen, Dioxyhalogenalkylen, CN, NO<sub>2</sub>, Alkenyl, Alkynyl, Alkoxyalkyl, Alkoxyalkoxy, Hydroxyalkoxy steht,
- R<sup>2</sup> für die bei R<sup>1</sup> angegebenen Reste steht,
- 40 R<sup>3</sup> für die bei R<sup>1</sup> angegebenen Reste steht,
- R<sup>4</sup> für Wasserstoff, Alkyl, Halogenalkyl oder Halogen steht,
- R<sup>5</sup> für die bei R<sup>4</sup> angegebenen Reste steht,
- Het für gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl steht das nicht über das Heteroatom an den übrigen Rest gebunden ist,
- 45 X, Y unabhängig voneinander für -O-, -S- stehen
- Z für -O-, -S-, -CH<sub>2</sub>-, -CHCH<sub>3</sub>-, -C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>- steht,
- m und n unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3 stehen ihre Summe aber gleich oder größer 2 ist.

Besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel I


in welcher

- 50 R<sup>1</sup> Wasserstoff, Methyl, Trifluormethyl, Methoxy, Trifluormethoxy, Chlor, Fluor steht
- R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht,
- R<sup>3</sup> für Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl steht,
- R<sup>4</sup> für Wasserstoff oder Methyl steht,
- R<sup>5</sup> für Methyl, Ethyl, Trifluormethyl oder Wasserstoff steht,
- 55 Het für Pyridyl oder Pyridazinyl steht die gegebenenfalls substituiert sind durch Fluor, Chlor, Methyl, NO<sub>2</sub>, Methoxy, Methylmercapto,
- X für O steht,
- Y für O steht,




Z für O, CH<sub>2</sub> oder -(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>- steht,  
 m für 1 steht,  
 n für 1 steht.

Im einzelnen seien folgende Verbindungen genannt:



R¹	R³	R⁵	R⁶	Z
H	H	CH <sub>3</sub>	H	O
H	H	CH <sub>3</sub>	2-Cl	O
5-F	H	CH <sub>3</sub>	H	O
H	H	CF <sub>3</sub>	H	O
H	H	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	H	O
H	H	H	H	O
H	H	CH <sub>3</sub>	H	CH <sub>2</sub>
H	H	CH <sub>3</sub>	H	C(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>

Zu den Benzoylharnstoffen gehören Verbindungen der Formel (V):



wobei


R¹ für Halogen steht,


R² für Wasserstoff oder Halogen steht,



R³ für Wasserstoff, Halogen oder C<sub>1-4</sub>-Alkyl steht,

R⁴ für Halogen, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkyl, C<sub>1-4</sub>-Alkoxy, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkoxy, C<sub>1-4</sub>-Alkylthio, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkylthio, Phenoxy oder Pyridyloxy die gegebenenfalls substituiert sein können durch Halogen, C<sub>1-4</sub>-Alkyl, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkyl, C<sub>4</sub>-Alkoxy, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkoxy, C<sub>1-4</sub>-Alkylthio, 1-5-Halogen-C<sub>1-4</sub>-alkylthio.


Insbesondere seien genannt:



R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>4</sup>
H	Cl	CF <sub>3</sub>
Cl	Cl	CF <sub>3</sub>
F	F	CF <sub>3</sub>
H	F	CF <sub>3</sub>
H	Cl	SCF <sub>3</sub>
F	F	SCF <sub>3</sub>
H	F	SCF <sub>3</sub>
H	Cl	OCF <sub>3</sub>
F	F	OCF <sub>3</sub>
H	F	OCF <sub>3</sub>
F	F	

F	F	
F	F	

Zu den Triazinen gehören Verbindungen der Formel (VI)



worin

R<sub>1</sub> für Cyclopropyl oder Isopropyl steht;

R<sub>2</sub> Wasserstoff, Halogen, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylcarbonyl, Cyclopropylcarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylcarbamoyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylthiocarbamoyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylcarbamoyl bedeutet; und

5 R<sub>3</sub> für Wasserstoff, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkyl, Cyclopropyl, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylcarbonyl, Cyclopropylcarbonyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylcarbamoyl, C<sub>1</sub>-C<sub>12</sub>-Alkylthiocarbamoyl oder C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>-Alkenylcarbamoyl steht und deren Säureadditionssalze, die für Warmblüter untoxisch sind.

Insbesondere seien genannt:

10

15

20

25

30

R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>
Cyclopropyl	H	H
Cyclopropyl	H	CH <sub>3</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>3</sub> H <sub>7-n</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>4</sub> H <sub>9-n</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>5</sub> H <sub>11-n</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>6</sub> H <sub>13-n</sub>
Cyclopropyl	H	C <sub>7</sub> H <sub>15-n</sub>

35

40

45

50

55

(Fortsetzung)

5	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>
	Cyclopropyl	H	C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -n
10	Cyclopropyl	H	C <sub>12</sub> -H <sub>25</sub> -n
	Cyclopropyl	H	CH <sub>2</sub> -C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -n
15	Cyclopropyl	H	CH <sub>2</sub> CH(CH <sub>3</sub> )C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	Cyclopropyl	H	CH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>
20	Cyclopropyl	Cl	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	Cyclopropyl	Cl	C <sub>6</sub> H <sub>13</sub> -n
	Cyclopropyl	Cl	C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> -n
25	Cyclopropyl	Cl	C <sub>12</sub> H <sub>25</sub> -n
	Cyclopropyl	H	Cyclopropyl
30	Cyclopropyl	H	COCH <sub>3</sub>
	Cyclopropyl	H	COCH <sub>3</sub> · HCl
35	Cyclopropyl	H	COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> · HCl
	Cyclopropyl	H	COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	Cyclopropyl	H	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n
40	Cyclopropyl	H	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -i
	Cyclopropyl	H	COC <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -t HCl
45	Cyclopropyl	H	COC <sub>4</sub> H <sub>9</sub> -n
	Cyclopropyl	H	COC <sub>6</sub> H <sub>13</sub> -n

50

55

(Fortsetzung)

5	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>
	Cyclopropyl	H	COC <sub>11</sub> -H <sub>23</sub> -n
10	Cyclopropyl	COCH <sub>3</sub>	COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>
	Cyclopropyl	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n	COC <sub>6</sub> H <sub>13</sub> -n
	Cyclopropyl	COCH <sub>3</sub>	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n
15	Cyclopropyl	COC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n
	Cyclopropyl	H	COCyclopropyl
20	Cyclopropyl	COCyclopropyl	COCyclopropyl
	Cyclopropyl	COCH <sub>3</sub>	COCH <sub>3</sub>
25	Isopropyl	H	H
	Isopropyl	H	COCH <sub>3</sub>
	Isopropyl	H	COC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -n
30	Cyclopropyl	H	CONHCH <sub>3</sub>
	Cyclopropyl	H	CONHC <sub>3</sub> H <sub>7</sub> -i
35	Cyclopropyl	CONHCH <sub>3</sub>	CONHCH <sub>3</sub>
	Cyclopropyl	H	SCNHCH <sub>3</sub>
40	Cyclopropyl	H	CONHCH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>
	Cyclopropyl	CONHCH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>	CONHCH <sub>2</sub> CH=CH <sub>2</sub>
45	Cyclopropyl	CSNHCH <sub>3</sub>	CSNHCH <sub>3</sub>

Besonders hervorgehoben seien die Wirkstoffe mit den common names Propoxur, Cyfluthrin, Flumethrin, Pyriproxyfen, Methoprene, Diazinon, Amitraz, Fenthion und Levamisol.

50 Die Formkörper können weiterhin die für Kunststoffe üblichen Additive enthalten. Übliche Additive sind beispielsweise Pigmente, Stabilisatoren, Fließmittel, Gleitmittel, Entformungsmittel.

In den folgenden Beispielen wird als Wirkstoff 1-[(6-Chlor-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinium (common name Imidacloprid) eingesetzt.

#### 55 B ispi l 1

SC-(Suspensionskonzentrat) Formulierung:  
368 g Imidacloprid

- 35 g Blockpolymer aus Emulgator Ethylenoxid- und Propylenoxid  
 12 g Ditolyethersulfonat-Formaldehyd-Kondensat (Emulgator)  
 3,5 g wasserlöslicher Polyvinylalkohol  
 58,0 g NH<sub>4</sub>Cl  
 5 116,0 g Harnstoff  
 1,2 g (37 %ige wäßrige Salzsäure)  
 4,6 g Xanthan-gum  
 560,5 g destilliertes Wasser

#### 10 Beispiel 2

WP (dispergierbares Pulver)-Formulierung:

- 25,0 g Imidacloprid  
 1,0 g Diisobutyl-naphthalin-Na-sulfonat  
 15 10,0 g n-Dodecylbenzylsulfonsäure Calcium  
 12,0 g hochdisperser Kieselsäure-haltiger Alkylarylpolyglykoether  
 3,0 g Ditolyethersulfonat-Formaldehyd-Kondensat (Emulgator)  
 2,0 g ®Baysilon-E, ein siliconhaltiger Entschäumer der Fa. Bayer AG  
 2,0 g feindisperses Siliciumdioxid und  
 20 45,0 g Kaolin

#### Beispiel 3

SL-(wasserlösliche Konzentrat)-Formulierung

- 25 18,3 g Imidacloprid  
 2,5 g neutraler Emulgator auf Basis Alkylarylpolyglykoether  
 3,5 g Natriumsulfobernsteinsäurediisooctylester  
 38,4 g Dimethylsulfoxid und  
 37,5 g 2-Propanol

30

#### Beispiel 4

SL-(wasserlösliche Konzentrat)-Formulierung

- 185, g Imidacloprid  
 35 5,0 g Natriumsulfonbernsteinsäurediisooctylester und  
 76,5 g Dimethylsulfoxid  
 werden einer 100 g Schampoo-Formulierung bestehend aus

- |                |  |
|----------------|--|
| 44,4 Gew.-%    | Marlon AT 50, ein Triethanolaminsalz von Alkylbenzolsulfonsäuren der Fa. Hüls AG |
| 40 11,1 Gew.-% | Marlon A 350, Natriumsalz von Alkylbenzolsulfonsäuren der Fa. Hüls AG            |
| 3,0 Gew.-%     | Kondensationsprodukt von Ölsäuren und Diethanolamin der Fa. Hüls AG und          |
| 41,5 Gew.-%    | Polyethylenglykol  |
- beigemengt.

#### 45 Beispiel 5

Spray-Formulierung bestehend aus

- 2,0 g Imidacloprid  
 10,0 g Dimethylsulfoxid  
 50 35,0 g 2-Propanol und  
 53,0 g Aceton

#### Beispiel 6

55 pour-on-Formulierung

- 20,3 g Imidacloprid  
 1,8 g Polyvinylalkohol  
 1,8 g Blockcopolymerisat auf Basis Ethylenoxid und Propylenoxid

0,26 g Xanthan Gum  
 9,0 g Glycerin  
 59,2 g destilliertes Wasser

#### 5 Beispiel 7

10

Zusammensetzung:	Imidachlopid	10,00 g
	Di-n-butyladipat	21,10 g
	Diethylhexylphthalat	9,10 g
	Epoxidiertes Sojabohnenöl	2,30 g
	Stearinsäure	0,80 g
	PVC	56,70 g

15

Herstellung: Die homogene Mischung aus Imidaclopid und PVC wird in einem Mischer mit dem Gemisch aus Di-n-butyladipat, Diethylhexylphthalat und Epoxidiertem Sojabohnenöl benetzt. Man mischt solange, bis die Mischung homogen ist. Dabei fördert Erwärmen, z.B. infolge einer Erhöhung der Tourenzahl des Mixers, das Einziehen der Weichmachermischung in das PVC. Nach der anschließenden homogenen Verteilung der Stearinsäure wird die Mischung im Spritzguß zu Hundehalsbändern geformt.

20

#### Beispiel 8

25

Zusammensetzung:	Imidachlopid	10,00 g
	Epoxidiertes Sojabohnenöl	2,30 g
	Stearinsäure	0,80 g
	Acetyltributylcitrat	30,20 g
	PVC	56,70 g

30

Herstellung: Das Gemisch aus Acetyltributylcitrat und Epoxidiertem Sojabohnenöl wird in einem Mischer auf die homogene Mischung aus Imidaclopid und PVC aufgebracht. Erwärmen fördert beim Mischen das Einziehen des Weichmachergemisches in das PVC; man mischt solange, bis die Mischung homogen ist. Die Mischung wird in herkömmlicher Weise zu Hundehalsbändern extrudiert.

35

#### Beispiel 9

40

Zusammensetzung:	Imidachlopid	20,00 g
	Epoxidiertes Sojabohnenöl	2,30 g
	Stearinsäure	0,80 g
	Acetyltributylcitrat	30,20 g
	PVC	56,70 g

45

Herstellung: wie Beispiel 8

50

55

**Beispiel 10**

5

Zusammensetzung:	Imidachlopid	7,50 g
	Epoxidiertes Sojabohnenöl	10,00 g
	Stearinsäure	0,80 g
	Acetyltributylcitrat	15,00 g
	PVC	66,70 g

10

Herstellung: wie Beispiel 8

**Beispiel 11**

15

Zusammensetzung:	Imidachlopid	10,00 g
	Epoxidiertes Sojabohnenöl	2,30 g
	Stearinsäure	0,80 g
	Triacetin	15,00 g
	PVC	71,90 g

20

Herstellung: Das Gemisch aus Triacetin und Epoxidiertem Sojabohnenöl wird in einem Mischer auf die homogene Mischung aus PVC und Imidachlopid aufgebracht. Dabei fördert Erwärmen, z.B. infolge einer Erhöhung der Tourenzahl des Mixers, das Einziehen des Weichmachers in das PVC. Nach homogener Untermischung der Stearinsäure wird die Mischung auf einem Extruder zu Platten extrudiert, aus denen Medaillons (= Anhänger für Halsbänder) ausgestanzt werden.

25

**Beispiel 12**

30

Zusammensetzung:	Imidachlopid	5,00 g
	Polyetherblockamid (Pebax®)	94,50 g

Herstellung: Der Wirkstoff wird in einem Intensivmischer auf den Träger aufgebracht und die Mischung in Spritzguß zu Hundehalsbändern geformt.

**Beispiel 13**

40

Zusammensetzung:	Imidachlopid	10,00 g
	Mittelkettige Triglyceride	15,00 g
	hochdisperses Siliciumdioxid	0,50 g
	Polyetherblockamid (Pebax®)	74,50 g

Herstellung: Mittelkettige Triglyceride werden in einem Mischer auf die homogene Mischung aus Imidachlopid und Polyetherblockamid aufgebracht. Erwärmen fördert dabei das Einziehen der mittelkettigen Triglyceride in das Polyetherblockamid. Zur Verbesserung der Fließfähigkeit wird vor der Extrusion der Mischung hochdisperses Siliciumdioxid homogen untergemischt. Es werden Platten extrudiert, aus denen Medaillons (= Anhänger für Halsbänder) ausgestanzt werden.

55



**Beispiel 14**

5

Zusammensetzung:	Imidacloprid	10,00 g
	Styrol-Butylen-Block-Copolymer (Thermoplast®K)	90,00 g

Herstellung: Der Wirkstoff wird in einem Intensivmischer auf den Träger aufgebracht und die Mischung im Spritzguß zu Halsbändern geformt.

10

**Beispiel 15**

15

Zusammensetzung:	Imidacloprid	5,00 g
	Copolyester (Hytrel®)	95,00 g

Herstellung: Die Mischung wird in herkömmlicher Weise zu Hundehalsbändern extrudiert.

**Beispiel 16**

25

Zusammensetzung:	Imidacloprid	10,00 g
	Polyetherblockamid (Pebax®)	90,00 g

Herstellung: Die homogene Mischung wird auf einem Extruder zu Platten extrudiert, aus denen Medaillons (= Anhänger für Halsbänder) ausgestanzt werden.

**Beispiel 17**

35

Zusammensetzung:	Imidacloprid	10,00 g
	mittelkettige Triglyceride	30,00 g
	hochdisperses Siliciumdioxid	0,50 g
	Polyetherblockamid (Pebax®)	59,50 g

Herstellung: wie Beispiel 13

40

**Beispiel A**

1 ml der im Beispiel 1 angegebenen SC-Formulierung wurde als Lösung pour-on auf die Schulter eines mit 200 Flöhen infestierten Hundes aufgetragen. Das Versuchstier konnte sofort von adulten Flöhen befreit werden. Die erfindungsgemäße Behandlung führt zu einer 100 %igen Mortalitätsrate der Flöhe.

45

**Anwendungsbeispiel A**

1 ml der in Beispiel 1 beschriebenen Formulierung wurde in 1 l Wasser verdünnt und mit dieser Lösung Hunde die mit Flöhen infestiert waren tropfnaß begossen. Es wurden folgende Ergebnisse erhalten:

50

55


	Zeitraum Tag	Anzahl der Flöhe pro Hund		% Wirkung
		unbehandelt	behandelt	
5	-1 Infestation mit 100 Flöhen			
	0 Behandlung und Zählung	30	0	100
	5, 8 Infestation mit 100 Flöhen			
10	9 Zählung	56	0	100
	15 Infestation mit 100 Flöhen			
	16 Zählung	76	0	100
15	19 Infestation mit 100 Flöhen (unbehandelte Tiere) 250 Flöhen (behandelte Tiere)			
	20 Zählung	39	0	100
	26 Infestation mit 100 Flöhen			
20	27 Zählung	43	0	100

### Anwendungsbeispiel B

25 1 ml der Lösung gemäß Beispiel 1 wurden auf die Schulter eines Hundes gegeben. Das Tier wurde nach 2 und nach 6 Tagen der Behandlung mit 200 Flöhen infestiert. Jeweils am Tag 3 und am Tag 7 nach Behandlung wurden die am Hund verbliebenen Flöhe gezählt. Es konnten keine lebenden Flöhe gefunden werden. Die Wirkung war 100 %.


### 30 Patentansprüche

1. Verwendung von Agonisten und Antagonisten der nicotinergen Acetylcholinrezeptoren von Insekten zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten wie Flöhen, Läusen und Fliegen an Menschen und Tieren.
- 35 2. Verwendung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoff Verbindungen der allgemeinen Formel (I) eingesetzt werden



in welcher

- R für Wasserstoff, gegebenenfalls substituierte Reste der Gruppe Acyl, Alkyl, Aryl, Aralkyl, Heteroaryl oder Heteroarylalkyl steht;
- 50 A für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Wasserstoff, Acyl, Alkyl, Aryl steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest Z verknüpft ist;
- E für einen elektronenziehenden Rest steht;
- X für die Reste -CH= oder =N- steht, wobei der Rest -CH= anstelle eines H-Atoms mit dem Rest Z verknüpft sein kann;
- 55 Z für eine monofunktionelle Gruppe aus der Reihe Alkyl, -O-R, -S-R,




5

steht oder für eine bifunktionelle Gruppe steht, die mit dem Rest A oder dem Rest X verknüpft ist.

- 10 3. Verwendung gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoffe Verbindungen der Formel (I) gemäß Anspruch 2 eingesetzt werden, in welcher die Reste folgende Bedeutung haben:

- R steht für gegebenenfalls substituiertes Heteroarylmethyl, Heteroarylethyl mit bis zu 6 Ringatomen und N, O, S, insbesondere N als Heteroatomen,  
 A steht für Wasserstoff sowie für gegebenenfalls substituiertes Alkyl oder Alkylen mit 1-4 C-Atomen und wobei die Alkylengruppen durch Heteroatome aus der Reihe N, O, S unterbrochen sein können,  
 15 A und Z können gemeinsam mit den Atomen, an welche sie gebunden sind, einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden. Der heterocyclische Ring kann weitere 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Heteroatome und/oder Heterogruppen enthalten,  
 20 E steht für NO<sub>2</sub>, CN, Halogenalkylcarbonyl,  
 X steht für -CH= oder -N=  
 Z steht für gegebenenfalls substituierte Reste Alkyl, -OR, -SR, -NRR, wobei R die oben angegebene Bedeutung hat,  
 Z kann außer dem obengenannten Ring gemeinsam mit dem Atom, an welches es  
 25 gebunden ist und dem Rest




30


an der Stelle von X einen gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Ring bilden.

4. Verwendung gemäß Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoff Verbindungen der allgemeinen Formeln (II) und (III) eingesetzt werden

35



40



45


50

in welchen


- 55 n für 1 oder 2 steht,  
 Subst. für Halogen steht,  
 A, Z, X und E die in Ansprüchen 2 und 3 angegebenen Bedeutungen haben.

5. Verwendung gemäß Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoff eine oder mehrere der folgenden Verbindungen eingesetzt werden:


5




10



15



20



25

30

35



40

45



50

55



5





10



15





20





25

30





35

40




45



50

55



- 20 6. Verwendung gemäß Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß als Wirkstoff Imidacloprid = 1-[(6-Chlor-3-pyridinyl)methyl]-N-nitro-2-imidazolidinium eingesetzt wird.
- 25 7. Mittel zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Menschen und Tieren, dadurch gekennzeichnet, daß sie die Wirkstoffe gemäß Ansprüchen 1 bis 6 enthalten.
8. Formkörper zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Tieren, dadurch gekennzeichnet, daß sie die Wirkstoffe gemäß Ansprüchen 1 bis 6 enthalten.
- 30 9. Verwendung der Wirkstoffe gemäß Ansprüchen 1 bis 7 zur Herstellung von Mitteln zur nicht-systemischen Bekämpfung von parasitierenden Insekten an Menschen und Tieren.

35

40

45

50

55



Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 6925

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
D,X Y	WO-A-93 24002 (CIBA-GEIGY AG) * Seite 1 - Seite 2, Absatz 6 * * Seite 3, Absatz 2 - Absatz 3 * * Seite 5, Absatz 1 * * Seite 7, letzter Absatz, Zeilen 4-7; Seite 8, Absatz 3, Zeilen 7-11 * * Seite 11, letzter Absatz - Seite 12, Absatz 2 * ---	1-5,7,9 6	A01N61/00 A01N51/00
Y	BRIGHTON CROP PROTECTION CONFERENCE-PESTS AND DISEASES, Nr. 1, 1990 THORNTON HEATH, GB; , Seiten 21-28, A.ELEBRT ET AL. 'Imidacloprid, a Novel Nitromethylene Analogue Insecticide for Crop Protection' * das ganze Dokument *	6	
X	EP-A-0 268 915 (BAYER AG) * Seite 1 - Seite 2 * * Seite 34, Zeile 17 - Zeile 21 * * Seite 35, Zeile 8 * * Seite 36, Zeile 12 - Zeile 28 * * Beispiel E * & DE-A-36 39 877 ---	1-4,7-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) A01N
D			
X	EP-A-0 483 052 (CIBA-GEIGY AG) * Seite 2, Zeile 1 - Zeile 21 * * Seite 4, Zeile 44 - Zeile 52 * * Seite 5, Zeile 46 - Zeile 47 * * Seite 15, Zeile 10 - Zeile 16 * ---	1-4	
X	EP-A-0 413 610 (SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.) * Seite 2, Zeile 24 - Zeile 35 * * Seite 2, Zeile 53 - Zeile 55; Beispiele 1,10,19-26 * * Ansprüche 1,2,9 * --- -/--	1,7,9	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemerit	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	29.August 1995		Muellners, W
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ----- A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 150 (3.1) (P/MC01)



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 6925

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	US-A-4 874 753 (R.C. BAKER) * Spalte 1, Zeile 4 - Zeile 52 * * Ansprüche * ---	1,7,9	
X	DE-A-587 853 (FIRMA HERMANN NIER) * das ganze Dokument * ---	1,7-9	
X	CH-A-114 863 (J. BRÜLHART) * das ganze Dokument * ---	1,7,9	
X	DATABASE WPI Derwent Publications Ltd., London, GB; AN 66-10652F & JP-B-63 000 244 (TANABE SEIYAKU) * Zusammenfassung * ---	1,7,9	
A	PFLANZENSCHUTZ-NACHRICHTEN BAYER, Bd. 44, Nr. 2, 1991 LEVERKUSEN,DE;; Seiten 113-136, A.ELBERT ET AL. 'Imidacloprid-a new systemic insecticide' siehe Seite 132-133, die Zusammenfassung ---	1-9	
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 91, no. 1, 2.Juli 1979 Columbus, Ohio, US; abstract no. 1323y, S.W. JONES ET AL. 'Interaction of insecticides with acetylcholine receptors' * Zusammenfassung * & NEUROTOXICOL. INSECTIC. PHEROMONES, [PROC. SYMP.] 1978, PUBL., 1979 NEW YORK, US;; Seiten 259-275, --- -/--	1-9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29.August 1995	Prüfer Muellners, W
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b> X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 95 10 6925

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 91, no. 9, 27. August 1979 Columbus, Ohio, US; abstract no. 69959r, R.D. O'BRIEN 'The interaction of pesticides with gates, receptors and enzymes of the nervous system' * Zusammenfassung * & ADV. PESTIC. SCI., PLENARY LECT. SYMP. PAP. INT. CONGR. PESTIC. CHEM. 4TH. 1978, PUBL., 1979 OXFORD, GB;, Seiten 449-457, -----	1-9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29. August 1995	Prüfer Muellners, W
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1500 01/92 (P04/C01)